

揸针疗法联合核心稳定性训练对脑瘫儿童粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力的影响

陈海, 杨斌, 孟文彬, 曹良东, 夏冰, 马丹丹

郑州大学第三附属医院康复医学科, 河南 郑州 450052

[摘要] **目的:** 观察揸针疗法联合核心稳定性训练对脑瘫儿童粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力的影响。**方法:** 选取73例脑瘫患儿, 按随机数字表法分为对照组36例及观察组37例。对照组给予运动疗法、作业疗法、物理因子治疗等康复治疗, 且在运动疗法后给予核心稳定性训练。观察组在对照组基础上给予揸针疗法。观察2组治疗前及治疗第4、8、12、16周后粗大运动功能评定(GMFM-88)、Berg平衡量表(BBS)、脑瘫儿童日常生活活动能力(ADL)量表评分的变化。**结果:** 治疗后, GMFM-88评分随着治疗时间延长而提高, 存在时间效应($P<0.05$); 观察组评分提高程度大于对照组, 存在分组效应($P<0.05$); 分组因素与时间因素对评分存在交互作用($P<0.05$)。在治疗第8周、第12周和第16周, 观察组GMFM-88评分均高于对照组($P<0.05$)。2组治疗后各时间点GMFM-88评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高, 差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗后, BBS评分随着治疗时间延长而提高, 存在时间效应($P<0.05$); 观察组评分提高程度大于对照组, 存在分组效应($P<0.05$); 分组因素与时间因素对评分存在交互作用($P<0.05$)。在治疗第8周、第12周和第16周, 观察组BBS评分均高于对照组($P<0.05$)。2组治疗后各时间点BBS评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高, 差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗后, ADL评分随着治疗时间延长而提高, 存在时间效应($P<0.05$); 观察组评分提高程度大于对照组, 存在分组效应($P<0.05$); 分组因素与时间因素对评分存在交互作用($P<0.05$)。在治疗第12周和第16周, 观察组ADL评分均高于对照组($P<0.05$)。2组治疗后各时间点ADL评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高, 差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论:** 揸针疗法联合核心稳定性训练可进一步促进脑瘫儿童粗大运动功能提升, 提高平衡功能及日常生活活动能力。

[关键词] 脑瘫; 揸针疗法; 核心稳定性训练; 粗大运动功能; 平衡功能; 日常生活活动能力

[中图分类号] R246.6 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 0256-7415 (2024) 03-0165-06

DOI: 10.13457/j.cnki.jncm.2024.03.032

Effects of Thumb-tack Needling for Subcutaneous Embedding Therapy Combined with Core Stability Exercises on Gross Motor Function, Balance Function and Activities of Daily Living in Children with Cerebral Palsy

CHEN Hai, YANG Bin, MENG Wenbin, CAO Liangdong, XIA Bing, MA Dandan

Department of Rehabilitation, The Third Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou Henan 450052, China

Abstract: **Objective:** To observe the effects of thumb-tack needling for subcutaneous embedding combined with core stability exercises on gross motor function, balance function and activities of daily living in children with cerebral palsy. **Methods:** A total of 73 cases of children with cerebral palsy were selected and divided into the control group and the observation group according to the random number table

[收稿日期] 2023-03-19

[修回日期] 2023-11-24

[作者简介] 陈海 (1978-), 男, 副主任中医师, E-mail: chenhaidejia@126.com。

method, with 36 and 37 cases in each group respectively. The control group was given rehabilitation therapy such as exercise therapy, occupational therapy and physical factor therapy, and core stability exercises were given after exercise therapy. The observation group was given thumb-tack needling for subcutaneous embedding based on the treatment of the control group. The changes in scores of Gross Motor Function Measure (GMFM-88), Berg Balance Scale (BBS) and Activities of Daily Living (ADL) of children with cerebral palsy in the two groups were observed before treatment and after 4, 8, 12 and 16 weeks of treatment. **Results:** After treatment, GMFM-88 scores were increased with the extension of treatment time, and there was a time effect ($P<0.05$); the increase in the observation group was greater than that in the control group, and there was a grouping effect ($P<0.05$); the grouping factor and time factor interacted with the scores ($P<0.05$). At the eighth, twelfth and sixteenth weeks of treatment, GMFM-88 scores in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.05$). The GMFM-88 scores in the two groups at each time point after treatment were higher than those before treatment and those at the previous time point of treatment, the difference being significant ($P<0.05$). After treatment, BBS scores were increased with the extension of treatment time, and there was a time effect ($P<0.05$); the increase in the observation group was greater than that in the control group, and there was a grouping effect ($P<0.05$); the grouping factor and time factor interacted with the scores ($P<0.05$). At the eighth, twelfth and sixteenth weeks of treatment, the BBS scores in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.05$). The BBS scores in the two groups at each time point after treatment were higher than those before treatment and those at the previous time point of treatment, the difference being significant ($P<0.05$). After treatment, ADL scores were increased with the extension of treatment time, and there was a time effect ($P<0.05$); the increase in the observation group was greater than that in the control group, and there was a grouping effect ($P<0.05$); the grouping factor and time factor interacted with the scores ($P<0.05$). At the twelfth and sixteenth weeks of treatment, the ADL scores in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.05$). When compared the ADL scores in the two groups at each time point after treatment with those before treatment and those at the previous time point of treatment, the difference being significant ($P<0.05$). **Conclusion:** Thumb-tack needling for subcutaneous embedding combined with core stability exercises can further promote the improvement of gross motor function, balance function and activities of daily living of children with cerebral palsy.

Keywords: Cerebral palsy; Thumb-tack needling for subcutaneous embedding; Core stability exercises; Gross motor function; Balance function; Activities of daily living

脑瘫是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限综合征，多存在粗大运动功能、平衡功能和日常生活活动能力的问题^[1]。临床常采用运动疗法、作业疗法和物理因子治疗等康复治疗，但整体效果不佳。中医对脑瘫治疗具有独特优势，推拿、针灸等疗效也得到循证医学的证据支持^[2]。揞针按压疗法有疼痛刺激性小、儿童配合度高和操作方

便等优点^[3]，齐腾澈等^[4]发现揞针按压疗法能够改善儿童核心肌群稳定性，提高儿童平衡及运动能力。核心稳定性训练可提高脑瘫儿童躯干核心肌群的稳定性，促使儿童获得姿势维持和运动控制的体验感^[5]。本研究采用前瞻性研究方法，以世界卫生组织制定的《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)为指南，观察揞针按压疗法联合核心稳定性训练对于脑

瘫儿童粗大运动功能、平衡功能、日常生活活动能力的影响,报道如下。

1 临床资料

1.1 纳入标准 符合《中国脑性瘫痪康复指南(2022)》^[1]中关于脑瘫诊断标准;年龄2~6岁;粗大运动功能分级系统(GMFCS)为Ⅱ~Ⅴ级;生命体征平稳;监护人对研究方法知晓并签署知情同意书。

1.2 排除标准 有遗传代谢或神经变性等进行性疾病所致的中枢性运动功能障碍;合并严重智力障碍、听力障碍、视力障碍;合并恶性肿瘤、先天性心脏病、癫痫频发、重度营养不良等疾病;正在接受其他治疗或训练耐受性差。

1.3 剔除标准 未按时完成治疗或评定;临床资料不全。

1.4 一般资料 选取2021年9月—2022年10月在郑州大学第三附属医院康复医学科收治的79例脑瘫儿童为研究对象,按随机数字表法分为对照组40例及观察组39例。其中6例患儿因严重呼吸道感染、癫痫发作等原因脱落,最终共纳入73例,对照组36例、观察组37例。对照组男21例,女15例;平均年龄(3.26±1.21)岁;痉挛型22例,不随意运动型6例,共济失调型5例,混合型3例。观察组男23例,女14例;平均年龄(3.44±1.36)岁;痉挛型25例,不随意运动型5例,共济失调型3例,混合型4例。2组基线资料比较,差异均无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。本研究已通过郑州大学第三附属医院伦理学委员会审批[(伦)审编号2023-134-01]。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予常规康复训练,由康复医学科医师根据儿童脑瘫类型和分级等病情制定个体化的康复处方,包括运动疗法、作业疗法、物理因子治疗等综合治疗,运动治疗后均进行核心稳定性训练。每项治疗每天1次,每周6次后休息1d,4周为1个疗程,连续治疗4个疗程。具体方法如下:①运动疗法。强调以主动运动训练为主,关节调节、反射性抑制屈曲和伸展等训练为辅,强化抬头、翻身、坐立、爬行、跪立、站立、行走等功能提高,针对核心肌群选择仰卧位拉起、仰卧位桥式、俯卧和侧卧位抬头、坐位抬腿、原地踏步、弯腰拾物等训练,每次30min。②作业疗法。包括肩肘关节伸

展性训练(套圈、推拉磨砂板等)、双手精细动作(敲鼓、绘画、折纸等)、日常生活能力等方面的训练(进食、排泄、睡眠、更衣等),每次30min。③物理因子治疗。根据脑瘫儿童运动障碍和异常姿势,针对性给予石蜡治疗、经颅磁刺激治疗、电子生物反馈疗法等治疗,每次30min。④核心稳定性训练。包括悬吊治疗(加强躯干核心肌群的训练,原则以闭链运动为主,辅以开链运动,提高关节稳定性;以渐进抗阻训练提高主动肌、固定肌、协同肌的力量)、Bobath球(以腰部的前屈、后伸和侧弯为训练重点)、平衡板(以坐位、站立位、跪位、爬行位重心转移为重点),每次10min。

2.2 观察组 在对照组基础上给予揸针按压疗法。取穴包括足三里、命门、关元、委中、腰阳关、大椎、气海、夹脊穴(双侧)、肾俞(双侧)。使用创新型皮内针(清铃揸针)[日本清铃株式会社,批准文号:国食药监械(进)字2012第2272550号(更),规格:0.20mm×0.90mm]。操作方法:用镊子夹持揸针胶布,针尖对准穴位后垂直揸入皮内,按压深度10mm。再从上轻柔按压胶布,无刺痛即可,留针24h。留针期间按压揸针处4次,每次每穴按压1min,按压频率80~100次/min,按压力度适中,2次按压间隔至少2h,每日更换揸针1次。每周6次后休息1d,4周为1个疗程,连续治疗4个疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 由取得资质的医师于治疗前及治疗后4周、8周、12周、16周对2组采用粗大运动能量表(GMFM-88)、Berg平衡量表(BBS)和脑瘫儿童日常生活活动能力(ADL)评定量表进行评估,医师对分组情况及治疗方案不知情。评估环境安静、独立、采光条件较好,室温控制于20~30℃。①GMFM-88。评价儿童粗大运动量功能,包括5个功能分区(共88项)。A区:卧位和翻身功能区(17项);B区:坐位功能区(20项);C区:爬和跪功能区(14项);D区:站立功能区(13项);E区:走、跑和跳功能区(24项)。每项评分为4级,评分标准按照各项完成动作程度。0分:完全不能完成(做);1分:仅开始能做(即完成动作<10%);2分:部分完成(10%<完成<100%);3分:能顺利圆满完成(即100%完成)。评分越高表示粗大运动能力越强。②BBS。评价儿童平衡功能,包括站起、坐下、

无支持的站等(共14项),每项评分为5级,即0、1、2、3、4,最高4分,最低0分。总分56分,评分越高表示平衡功能越好。③脑瘫儿童ADL量表。评价儿童日常生活活动能力,包括个人卫生动作、进食动作、更衣动作等9个部分(共50项)。每项评分为5级。2分:能独立完成;1.5分:能独立完成但时间较长;1分:需他人辅助完成;0.5分:即使辅助也很困难;0分:不能完成。总分100分,得分越高表示儿童日常生活活动能力越好。

3.2 统计学方法 应用SPSS22.0统计学软件处理数据。计数资料以百分比(%)表示,采用 χ^2 检验。满足正态分布的计量资料采用均数 \pm 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,其组间比较采用 t 检验。治疗前及治疗过程中各时间点的比较采用两因素重复测量资料的方差分析,因不满足球形检验且校正系数Epsilon中Greenhouse-Geisser <0.7 ,故选择Greenhouse-Geisser检验。2组各时间点组内的两两比较采用LSD检验。各时间点的组间差异比较采用两独立样本 t 检验,并进行Bonferroni校正。检验水准 $\alpha=0.05$ 。

4 治疗结果

4.1 2组治疗前及治疗过程中各时间点GMFM-88评分比较 见表1。治疗前,2组GMFM-88评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后,GMFM-88评分随着治疗时间延长而提高,存在时间效应($P<$

0.05);观察组评分提高程度大于对照组,存在分组效应($P<0.05$);分组因素与时间因素对评分存在交互作用($P<0.05$)。在治疗第8周、第12周和第16周,观察组GMFM-88评分均高于对照组($P<0.05$)。2组治疗后各时间点GMFM-88评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高,差异有统计学意义($P<0.05$)。

4.2 2组儿童治疗前及治疗过程中各时间点BBS评分比较 见表2。治疗前,2组BBS评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后,BBS评分随着治疗时间延长而提高,存在时间效应($P<0.05$);观察组评分提高程度大于对照组,存在分组效应($P<0.05$);分组因素与时间因素对评分存在交互作用($P<0.05$)。在治疗第8周、第12周和第16周,观察组BBS评分均高于对照组($P<0.05$)。2组治疗后各时间点BBS评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高,差异有统计学意义($P<0.05$)。

4.3 2组治疗前及治疗过程中各时间点ADL评分比较 见表3。治疗前,2组ADL评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后,ADL评分随着治疗时间延长而提高,存在时间效应($P<0.05$);观察组评分提高程度大于对照组,存在分组效应($P<0.05$);分组因素与时间因素对评分存在交互作用($P<0.05$)。在治疗第12周和第16周,观察组ADL评分均

表1 2组治疗前及治疗过程中各时间点GMFM-88评分比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗4周	治疗8周	治疗12周	治疗16周	时间效应	分组效应	交互效应
对照组	36	55.08 \pm 13.42	57.86 \pm 13.21 ^①	59.00 \pm 13.15 ^{①②}	63.92 \pm 14.01 ^{①③}	65.08 \pm 14.84 ^{①④}			
观察组	37	56.73 \pm 14.86	61.76 \pm 15.28 ^①	67.73 \pm 16.79 ^{①②}	72.22 \pm 17.64 ^{①③}	78.35 \pm 16.79 ^{①④}			
t/F 值		-0.49	-1.15	-2.44	-2.19	-3.53	374.86 ^⑤	4.11 ^⑤	48.31 ^⑤
P 值		0.63	0.26	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01

注:①与本组治疗前比较, $P<0.05$;②与治疗4周比较, $P<0.05$;③与治疗8周比较, $P<0.05$;④与治疗12周比较, $P<0.05$;⑤重复测量方差分析的 F 值

表2 2组治疗前及治疗过程中各时间点BBS评分比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗4周	治疗8周	治疗12周	治疗16周	时间效应	分组效应	交互效应
对照组	36	22.22 \pm 5.59	23.08 \pm 5.66 ^①	24.03 \pm 5.58 ^{①②}	26.17 \pm 5.81 ^{①③}	27.19 \pm 6.21 ^{①④}			
观察组	37	22.70 \pm 5.47	24.89 \pm 5.55 ^①	27.89 \pm 5.72 ^{①②}	31.41 \pm 5.68 ^{①③}	34.81 \pm 6.08 ^{①④}			
t/F 值		-0.37	-1.39	-2.88	-3.84	-5.22	768.27 ^⑤	8.05 ^⑤	124.91 ^⑤
P 值		0.72	0.17	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

注:①与本组治疗前比较, $P<0.05$;②与治疗4周比较, $P<0.05$;③与治疗8周比较, $P<0.05$;④与治疗12周比较, $P<0.05$;⑤重复测量方差分析的 F 值

高于对照组($P<0.05$)。2组治疗后各时间点ADL评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高,差异有统计学意义($P<0.05$)。

表3 2组治疗前及治疗过程中各时间点ADL评分比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗4周	治疗8周	治疗12周	治疗16周	时间效应	分组效应	交互效应
对照组	36	49.17±8.95	52.28±8.82 ^①	53.17±8.78 ^{①②}	55.14±8.86 ^{①③}	56.08±8.95 ^{①④}			
观察组	37	49.65±12.51	53.97±12.55 ^①	56.95±12.75 ^{①②}	62.92±12.79 ^{①③}	68.92±12.79 ^{①④}			
<i>t/F</i> 值		-0.19	-0.66	-1.45	-2.97	-4.89	1 344.97 ^⑤	4.20 ^⑤	328.34 ^⑤
<i>P</i> 值		0.85	0.51	0.15	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01

注:①与本组治疗前比较, $P<0.05$;②与治疗4周比较, $P<0.05$;③与治疗8周比较, $P<0.05$;④与治疗12周比较, $P<0.05$;⑤重复测量方差分析的*F*值

5 讨论

脑瘫儿童常存在姿势异常、肌力低下和躯干核心稳定性不佳等障碍,严重影响儿童的粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力^[6]。核心稳定性是脑瘫儿童维持姿势和发起运动的先决条件,通过核心稳定性训练能提高躯干核心肌群和四肢骨骼肌的肌力,改善动作协调性及姿势的稳定性^[7]。本研究发现,随着治疗时间的延长,揸针按压疗法结合核心稳定性训练和常规康复治疗可有效提高脑瘫儿童粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力,且疗效优于单纯核心稳定性训练结合常规康复治疗的方案。

中医学认为脑瘫的病机为先天禀赋不足,后天喂养失调,脾胃虚弱,气血生化乏源,导致筋肉失养、筋骨痿软,或筋肉失于约束、弛缓不收^[8]。表现为五迟、五软和痿证。五迟即为先天禀赋不足、肾气亏虚,或者后天养护不当、五脏虚损所致,表现为立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟。五软即为小儿先天之气未充,或者后天喂养不当,病后失调,脾胃虚损所致,表现为头、项、口、手、足、肌肉等无力。痿证即为先天发育不良或后天损伤导致脾胃虚弱、肝肾亏损、筋脉肌肉失养所致,主要表现为肢体无力、筋脉收缩、肌肉萎缩、不能运动^[9]。揸针按压疗法属于穴位埋针的一种,具有刺激穴位、活血通经、调畅气机的功效,其刺激的疼痛性较小,可减轻儿童对于针刺治疗的恐惧,也不需儿童保持固定的留针姿势,操作方便。通过对核心肌群的揸针按压疗法,改善肌力、纠正异常姿势、强化核心肌群对躯干稳定性方面的控制^[3]。同时,揸针按压疗法可持续性地刺激和按摩经络穴位,促进脑瘫儿童

血液循环系统,改善儿童大脑皮层、皮层下中枢的兴奋与抑制,起到中枢神经系统反馈调控作用,提高儿童运动功能^[8]。

本研究所取穴位包括督脉的大椎、命门、腰阳关,足阳明胃经的足三里,足太阳膀胱经的肾俞、委中和夹脊穴^[8]。大椎穴位于第7颈椎棘突下凹陷处,手足三阳的阳热之气由此汇入本穴并与督脉的阳气上行头颈。命门穴位于第2腰椎棘突下凹陷处,有益肾壮阳、强腰镇痛、清热安神、调理冲任的作用。腰阳关位于第4腰椎棘突下凹陷处,配肾俞、委中,可温经散寒,通经活络,补督脉阳气,通督健脑。督脉为阳脉之海,沿脊柱向上入络大脑,是联络大脑与肾中阴阳的通路,揸针按压督脉可激发周身经脉阳气,温煦四肢,通督益气,强筋健脑,促进脑瘫儿童中枢神经系统发育和运动功能的改善,同时增强脊柱力量,提高脊柱的稳定性。足三里穴是足阳明胃经的合穴,合治内腑,以治疗六腑病症为重,有调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正驱邪的功能。肾俞穴属足太阳膀胱经,位于第2腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸,肾脏的寒湿水气由此外输膀胱经,外散肾脏之热,肾俞穴配合命门穴,可调补肾气,温补元阳,益肾强腰,健脾益气,利水祛湿。委中穴是足太阳膀胱经合穴,膀胱经的湿热水气在此聚集,取委中可以振奋膀胱经气血,治疗腰背部疼痛强直。夹脊穴位于人体脊柱两侧,与背俞穴相邻,夹脊穴可激发督脉和足太阳膀胱经气血,行气活血,调节脏腑功能,理筋散结,强壮筋骨。夹脊穴位于人体脊神经所在的位置,分布着丰富的周围神经末梢,通过揸针按压刺激夹脊穴可促进中枢神经和周围神

经系统的反馈通路,促进运动系统功能恢复^[10]。

本研究基于ICF框架下的康复理念,采用与传统运动疗法不同的训练模式,强调以运动控制和任务导向性训练(TOT)为主,以关节调节、反射性抑制屈曲和伸展等训练为辅的运动疗法训练方式,在运动训练过程中重视核心稳定性的训练^[11]。而以Bobath疗法为主的传统运动疗法,其核心是抑制异常姿势和运动模式,诱发正常运动,但其对深层肌肉群所诱发的姿势控制和运动模式训练效果不佳,并且存在儿童配合度不良和参与主动性不佳等问题^[12]。根据ICF框架,国际上对于脑瘫儿童的干预措施发生较大变化,更加关注活动及现实生活中任务训练^[13]。有研究表明,以运动控制和TOT为主的运动疗法可有效提高脑瘫儿童运动水平,改善运动功能、平衡功能和ADL能力。另外,通过对受损肢体高强度的主动运动功能训练,可引导脑瘫儿童产生自发主动运动,从而完成日常生活中的任务和目标。

综上,揸针疗法联合核心稳定性训练可进一步促进脑瘫儿童粗大运动功能提升,提高平衡功能及日常生活活动能力。但本研究存在样本量偏少、研究时间短、取穴偏颇等不足,后续研究将进一步完善。

[参考文献]

- [1] 中国康复医学会儿童康复专业委员会. 中国脑性瘫痪康复指南(2022)[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(12): 887-892.
- [2] 王愿望, 刘蕊露, 王茜煜, 等. 以推拿为主治疗小儿脑瘫临床疗效的系统评价[J]. 湖南中医杂志, 2022, 38(7): 115-120.
- [3] 中国康复医学会儿童康复专业委员会. 中国脑性瘫痪康复指南(2022)第五章: 中医康复治疗[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(18): 1365-1376.

- [4] 齐腾澈, 王春南. 揸针按压疗法对脑瘫患儿核心肌群稳定性影响的临床对比研究[J]. 中国针灸, 2018, 38(6): 597-601.
- [5] 中国康复医学会儿童康复专业委员会. 中国脑性瘫痪康复指南(2022)第四章: 康复治疗(上)[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(16): 1201-1229.
- [6] JACKMAN M, SAKZEWSKI L, MORGAN C, et al. Interventions to improve physical function for children and young people with cerebral palsy: international clinical practice guideline[J]. Dev Med Child Neurol, 2022, 64(5): 536-549.
- [7] FARJOUN N, MAYSTON M, FLORENCIO L L, et al. Essence of the Bobath concept in the treatment of children with cerebral palsy. A qualitative study of the experience of Spanish therapists[J]. Physiother Theory Pract, 2022, 38(1): 151-163.
- [8] 涂秋月, 谭晨光, 翟东子, 等. 基于经筋理论运用筋结点治疗痉挛型脑瘫探析[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(6): 3045-3048.
- [9] 岳玲, 王静, 王泽熙, 等. 揸针按压疗法联合推拿手法治疗对脑性瘫痪患儿表面肌电信号变化的影响[J]. 河北中医, 2022, 44(1): 107-111, 116.
- [10] 吴奕池, 李琰华, 周觉. 循经针灸推拿法治疗小儿痉挛型脑瘫疗效观察及对肌肉痉挛、运动发育的影响[J]. 新中医, 2019, 51(8): 227-230.
- [11] 中国康复医学会儿童康复专业委员会. 中国脑性瘫痪康复指南(2022)第三章: ICF-CY框架下的儿童脑瘫评定[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(15): 1121-1141.
- [12] KATO M, ARAI H, KOMATSU K, et al. The Lower the Physical Function, the Higher the Quality of Life in Japanese Adolescents with Cerebral Palsy[J]. Phys Occup Ther Pediatr, 2023, 43(6): 713-724.
- [13] DAMIANO D L, LONGO E, CAROLINA DE CAMPOS A, et al. Systematic Review of Clinical Guidelines Related to Care of Individuals With Cerebral Palsy as Part of the World Health Organization Efforts to Develop a Global Package of Interventions for Rehabilitation[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2021, 102(9): 1764-1774.

(责任编辑: 吴凌, 郭雨驰)